RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

agreste
La statistique, l'évaluation et la prospective du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

INFOS RAPIDES

JUILLET 2025 N° 93

Données des figures et données complémentaires à télécharger

ISOP – n°04 / 08


En juillet 2025, une pousse de l'herbe déficitaire sur une grande partie de la France

En juillet 2025, la pousse cumulée de l'herbe est désormais déficitaire de 16 % par rapport à la normale. Alors que la campagne avait bien débuté, le manque d'eau commence à avoir des conséquences défavorables sur la production d'herbe. Le ralentissement commencé en mai s'est accentué en juin et encore plus en juillet et affecte désormais une grande partie la France métropolitaine.

L'herbe ne pousse presque plus

Au 20 juillet 2025, la pousse cumulée des prairies permanentes en France métropolitaine est désormais inférieure de 16 % à la moyenne observée sur la période de référence 1989-2018, conséquence des conditions météorologiques souvent chaudes et sèches. Sur les mois de juin et juillet, moins de la moitié de la pousse d'herbe attendue a été réalisée. Sur le mois de juillet particulièrement, qui réalise en moyenne 12% de la pousse annuelle de référence, la pousse n'a atteint que 1,5%. Au 20 juillet, la pousse cumulée atteint 58 % de la pousse annuelle de référence contre 69 % normalement.

Figure 1 : Évolution de la production des prairies permanentes




Sources : INRAe, Météo France, SSP

Une pousse cumulée déficitaire sur une grande partie du pays

Le déficit de pousse de l'herbe, qui concernait dans un premier temps uniquement les régions du Nord, s'étend. Il est particulièrement important dans les Hauts-de-France et dans les Pays de la Loire où il atteint respectivement 37 % et 32 %. La situation s'est dégradée au sud d'une ligne allant du Pays Basque à la Franche-Comté mais reste encore globalement dans la normale. Seulement 8 % des régions fourragères sont excédentaires, elles regroupent seulement 4 % des surfaces en prairies. La pousse cumulée est proche de la normale dans près d'un tiers des surfaces en prairies permanentes, essentiellement dans le Massif central et au nord des Alpes. Dans 59 % des régions fourragères (66 % des surfaces) la pousse cumulée est déficitaire. Il y a même un quart des régions fourragères (31 % des surfaces) qui présentent un déficit important (supérieur à 25 %) depuis le début de la campagne.


Figure 2 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région fourragère au 20 juillet 2025



Note de lecture : l'indicateur de rendement des prairies permanentes Isop, à une date donnée, est égal au rapport entre la pousse cumulée à cette date depuis le début de la campagne et la pousse cumulée à la même date calculée sur la période de référence 1989-2018. La taille des pastilles est proportionnelle aux surfaces en prairies permanentes de chaque RF.

Sources : INRAe, Météo France, SSP

Figure 3 : Indicateur de rendement des prairies permanentes par région au 20 juillet 2025



Dominique Fiche
SSP - SDSAFA/BSVAE

Sources, définitions et méthodologie

Le système Isop - Informations et suivi objectif des prairies - fournit des estimations de rendement des prairies temporaires et permanentes productives à l'échelle de la région fourragère à partir d'un modèle de simulation (STICS-Prairies). Il est opérationnel sur la quasi-totalité du territoire de la France métropolitaine.

Le système Isop calcule les quantités de matière sèche cumulée par hectare au pas de temps journalier sur 209 régions fourragères au total. Les simulations sont effectuées lorsqu'un type de prairies donné – permanentes ou temporaires - couvre plus de 7 000 hectares par région fourragère et 2 000 hectares pour les départements du pourtour méditerranéen. Les prairies productives situées au-dessus de 1 000 mètres peuvent parfois être moins bien représentées à l'échelle des régions fourragères. Le système ne tient pas compte de l'état des sols, ni des inondations, quelles que soient leur durée et leurs causes. Ainsi, la production estimée, en fonction des conditions pédoclimatiques locales, n'est pas forcément exploitable en totalité.

Les résultats de simulation sont extraits au 20 de chaque mois par région fourragère, entre mars et novembre, sous forme d'un rapport à la normale correspondant à la moyenne calculée sur la période 1989-2018.

Isop est le fruit d'une étroite collaboration entre Météo-France, l'INRAe et le SSP.

Cette « Infos rapides » ne traite que des résultats des **prairies permanentes productives.**

Par convention, la production est dite **excédentaire** quand l'indice ISOP dépasse 110, elle est considérée comme **normale** quand l'indice est compris entre 90 et 110, **faiblement déficitaire** si l'indice est compris entre 75 et 90, **fortement déficitaire** si l'indice est inférieur à 75.

Calendrier de publication des infos rapides – Prairies :
Avril - mai - juin - juillet – août - septembre - octobre - novembre

Pour en savoir plus

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole dans la rubrique Conjoncture. Toutes les séries conjoncturelles publiées pour le thème de cette Infos Rapides sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole :
www.agreste.agriculture.gouv.fr
La guide méthodologique ISOP est disponible dans l'espace « Sources, définitions, méthodes » ou directement sur Guide d'utilisation d'ISOP

STATISTIQUE PUBLIQUE

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Secrétariat général
Service de la statistique et de la prospective
3 rue Barbet de Jouy
75349 Paris

Directeur de la publication : Vincent Marcus
Composition : SSP
ISSN 2726-6621
© Agreste 2025